

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷十

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜惟吉

謄錄監生臣繆瀛

欽定四庫全書

外臺秘要方卷十

唐 王燾 撰

肺痿方一十首

千金論曰寸口脉數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難駛藥下利重亡津液故得肺痿

又寸口脉不出而反發汗陽脉早索陰脉不澀三焦踰  
蹶入而不出身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難  
此為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如脉腦但坐發汗故  
也其病欲欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利甚則  
脉浮弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便  
數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師  
曰肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也

出第

仲景傷寒論療肺痿吐涎唾不欬者其人不渴必遺溺  
小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺冷必眩  
甘草乾薑湯主之以溫其臟方

甘草

炙 四兩

乾薑

二兩

右二味切以水三升煮取一升半分溫二服服湯已  
小溫覆之若渴者屬消渴忌海藻松菜

又療肺痿涎唾多心中溫溫液液者炙甘草湯方

甘草

炙 四兩

生薑

去皮 三兩

人參

二兩

地黃

一斤

阿膠

三兩  
炙

大麻子仁

半升

大棗

四十枚

桂心

二兩

麥門冬

半斤  
去心

右九味切以美酒七升水八升相和先煮八味取四升絞去滓內膠上微火烱銷溫服七合日三夜一出

第八卷中

肘後療肺痿欬吐涎沫心中溫溫咽燥而渴者方

云一

不渴

生天門冬

一升  
搗取汁

酒

一升

飴糖

一斤

紫莞

合末四

右四味合銅器中於湯上煎可丸服如杏仁一九日

三忌鯉魚

范汪經心錄同  
出第一卷中

集驗療肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴方

一云  
不渴

生薑

五兩

人參

三兩

甘草

二兩  
炙

大棗

十二枚  
擘

右四味切以水五升煮取一升半分再服忌海藻松

菜

仲景傷寒論備急范  
汪千金經心錄同

又療肺痿欬涎沫心中溫溫咽燥而渴方

一云  
不渴

生薑

五兩

甘草

二兩  
炙

大棗

十二枚  
擘

右三味切以水五升煮取一升半分再服一方乾薑

三兩代生薑忌海藻松菜

文仲千金古今錄驗同深  
師云溫脾湯范汪亦同

又療肺痿時時寒熱兩頰赤氣急方

童子小便每日晚取之去初末少許小便可有五

合取上好甘草量病人中指節男左女右長短截

之炙令熟破作四片內小便中置於閑淨處露一

宿器上橫一小刀明日平旦去甘草頓服之每日



一劑其童子勿令喫五辛忌海藻松菜熱麪

第四出

中卷

刪繁療虛寒喘鳴多飲逆氣嘔吐半夏肺痿湯方

半夏

一升湯洗

母薑

一斤

橘皮

一斤

白朮

八兩

桂心

四兩

右五味切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌羊

肉錫桃李崔肉生葱

一方有桑白皮切一升

又療凡虛寒肺痿喘氣乾地黃煎方

乾地黄

五兩

桑根白皮

切二升

芡莢

五兩

桂心

人參

各三兩

大麻仁

一升炒

右六味切以水九升先煮五味取三升去滓內大麻

仁煎數沸分三服忌生葱薤薹

並出第  
二卷中

千金療肺痿涎唾多出心中溫溫液液甘草湯方

甘草

二兩炙

右一味切以水三升煮取一升半分溫三服忌海藻

菰菜

范汪  
同

又療肺痿吐涎沫桂枝去芍藥加皂莢湯方

桂心

三兩

甘草

二兩炙

大皂莢

一挺去皮子炙

生薑

三兩

大棗

十二枚擘

右五味切以水七升微火煮取三升分三服忌生葱

海藻松菜

范汪經心錄同並出第十七卷中

肺氣客熱方二首

延年百部根飲主肺氣客熱暴傷風寒因嗽不安方

百部根

一兩半

天門冬

二兩去心

紫菀

一兩半

貝母

乾葛

白前

橘皮

各一兩

生薑

二兩

葱白

切三合

豉

三合

右十味切以水六升煮取一升七合去滓分溫三服

疎數任情亦可分為四服欲間食亦得禁生冷鯉魚

蒜

出第五卷中

古今錄驗療肺客熱并肝心家氣人參湯方

桂心

甘草

炙各三兩

人參

乾薑

防風

各二兩

白朮

一兩半

右六味切以水八升煮取三升分三服日三宜溫忌

桃李雀肉生葱海藻松菜

出第二十卷中

肺熱兼效方七首

刪繁療肺熱氣上欬息奔喘橘皮湯方

橘皮

杏仁

四兩去  
共皮

柴胡

麻黃

去節各  
三兩

乾蘇葉

二兩

母薑

四兩  
去共

石膏

八兩

右七味切以水九升先煮麻黃兩沸除沫下諸藥煮

取三升去滓分三服不差再服

母薑千金云宿薑千金同出第五卷中

千金療肺熱悶不止胃中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胃中喘氣方

桃皮

斗一

芫花

斗一

右二味以水四斗煮取一斗去滓以故布手巾內汁中薄胃溫四肢不盈數日即歇

又凡右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名肺熱實也

又療肺熱實胃憑仰息泄氣除熱湯方

枸杞根皮

二升

白前

三兩

石膏

八兩碎綿裹

杏仁

三兩去尖

皮研

橘皮

白朮

各五分

赤蜜

七合

右七味切以水七升煮取二升去滓下蜜更煮兩三沸分三服忌桃李雀肉等

又療肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黄

切二升

石膏

八兩

淡竹茹

如雞子大一枚

杏仁

四兩去皮研

羚羊角

屑三兩

芒硝

三兩

赤蜜

一升

麻黃

五兩  
去節

升麻

三兩

右九味以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三

服忌蕪荑

出第十  
七卷中

延年天門冬煎主肺熱魚鱖聲不出方

生天門冬

汁一升

橘皮

二兩

生地黃

汁五

升

白蜜

五合

牛酥

三合

白糖

五兩

杏仁

一升  
去尖皮

貝母

紫苑

通草

各三兩

百部根

白前

甘草

炙各二兩

人參

二兩



右十四味切以水六升煮貝母等藥取二升五合去  
滓內天門冬地黃汁煎可減半內酥蜜生薑等煎令  
可丸稍強取如雞子黃大含嚥之日四五度忌鯉魚

蕪荑海藻松菜等

張文仲處

又地黃麥門冬煎主肺熱魚效方

生地黃汁

三升

生麥門冬

三升

生薑汁

一合

酥

二合

白蜜

二合

右五味先煎地黃麥門冬薑汁等三分可減一分內

酥蜜煎如稀飴內貝母末八分紫菀末四分攪令調  
一服一匙日二服夜一服忌蕪荑

又天門冬煎主肺間熱欬咽喉塞方

天門冬

三兩  
去心

麥門冬

二兩  
去心

款冬花

一兩

貝母

一兩

紫菀

二兩

茯苓

二兩

升麻

二兩

生薑

汁三升

蜜

一升

酥

一合

地黄

汁三升

右十一味切以水八升煮七物取一升去滓內生薑  
地黄汁煮取一升內蜜酥於銀器中加湯上煎令成

九一服如彈丸一枚含嚙日夜三五丸忌醋物蕪荑

鯉魚等

顏仁  
楚處

又羚羊角飲主肺熱胃背痛時時乾欬不能食方

羚羊角

屑二兩

貝母

生薑

茯苓

各三兩

橘皮

人參

芍藥

各二兩

右七味切以水五升煮取一升八合去滓分溫三服

每服如人行八九里久更服禁生冷蒜麴醋

並出第  
五卷中

肺虛寒方三首

刪繁療肺虛寒癘風所傷聲音嘶塞氣息喘憊效唾酥  
蜜膏酒止氣效通聲方

酥

崖蜜

飴糖

生薑

汁

生百部

汁

大棗肉

研為脂

杏仁

去皮

甘皮

五具末

右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久薑汁  
并百部汁各減半停下溫清酒一升服方寸匕細細

嚙之日夜三

千金同出  
第六卷中

千金療肺虛寒癘風傷語音嘶塞氣息喘憊嗽唾方

猪脰

三具

大棗

一百枚  
去核

好酒

五升

右三味以酒漬二味秋冬七日春夏三日生布絞去

滓二七日服盡忌鹽無猪脰以羊脰代

肘後張文仲  
備急同出第

十八  
卷中

又凡右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦  
少氣不足以息嗑乾不津液病名曰肺虛寒也

又療肺虛寒則聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛瘠風入  
肺防風散方

防風

獨活

芎藭

川椒

汗

黃芪

各七分

附子

炮七分

乾薑

七分

石膏

研

天雄

炮

甘草

炙

山茱萸

麻黃

去節

五味子

各六分

秦艽

桂心

山藥

杜仲

人參

防己

各五分

貫衆

二枚

紫菀

菊花

各四分

細辛

五分

當歸

五分

右二十四味擣篩為散酒服方寸匕日再忌海藻松

菜猪肉冷水生葱生菜

一方無石膏當歸  
出第十七卷中

肺氣不足口如含霜雪方四首

廣濟療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無聲音劇者吐血苦寒五味子湯方

五味子

三兩

大棗

五十枚擘

桑根白皮

一升

藁本

二兩

鍾乳

三兩

款冬花

二兩

雞蘇

二兩

右七味切以水九升煮取三升分溫三服每服如人

行七八里進一服忌猪魚炙肉熱麪陳臭等物

此方甚良

又療肺氣不足逆氣胃滿上迫喉咽閉塞短氣連唾相

屬寒從背起口如含霜雪語無音聲劇者唾血腥臭或歌或哭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面白紫菀湯方

紫菀

五味子

生薑

合皮切

白石英

研綿裝

款冬花

桂心

人參

各二兩

鍾乳

研綿裹

麥門冬

去心

桑根白皮

各三兩

大棗

二十枚擘

粳米

一合

右十二味切水一斗五升先煮桑根白皮粳米取九升去滓內諸藥煎取三升去滓分溫三服每服相去



如人行七八里久忌生葱熱麵炙肉

深師千金無紫苑人參並出第

二卷

中

深師療肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞短氣寒從背起口中如含霜雪語言失聲甚者吐血補肺湯方

五味子

三兩

乾薑

二兩

款冬花

二兩

桂心

一尺

麥門冬

一升  
去心

大棗

一百  
枚擘

粳米

二合

桑根白皮

一斤

右八味切以水一斗二升先煮棗并桑白皮粳米五

沸後內諸藥煮取三升分三服忌生葱

千金同出第  
十八卷中

集驗補肺湯療肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪語無音聲而渴舌本乾燥方

五味子

白石英

研綿裹

鍾乳

同上

桂心

橘皮

桑根白皮

各三兩

粳米

二合

茯苓

竹葉

款冬花

紫菀

各二兩

大棗

五十枚

杏仁

五十枚去兩仁去皮

蘇子

一升

生薑

五兩

麥門冬

四兩去心

右十六味切以水一斗三升先煮桑白皮棗粳米熟

去滓內諸藥煮取四升分三服日再夜一忌大酢生

葱

千金同出  
第四卷中

肺脹上氣方四首

五法

廣濟療患肺脹氣急效嗽喘麤眠卧不得極重恐氣欲  
絕紫菀湯方

紫菀

六分

甘草

八分

檳榔

七枚

茯苓

八分

葶藶子

三合炒末  
湯成下

右五味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服

每服如人行四五里久進之以快利為度忌生葱菜

熱麴海藻松菜大醋蒜粘食

出第二卷中

仲景傷寒論肺脹者欬而上氣煩躁而喘脉浮者以心

下有水宜服小青龍湯加石膏主之方

麻黃

三兩  
去節

五味子

半升

石膏

綿裹

乾薑

芍藥

細辛

各三兩

桂心

甘草

各三兩炙

半夏

半升洗

右九味切以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥煮取二升半去滓溫服強人一升瘦人及老小以  
意減之日三夜一忌生葱生菜海藻松菜羊肉錫等  
又肺脹者病人喘目如脫狀脉浮大也肺脹而欬者越  
婢加半夏湯主之方

大棗

十五枚擘

半夏

半升洗

生薑

三兩

麻黃

六兩去節

甘草

二兩炙

石膏

半斤

右六味切以水六升先煮麻黃三二沸去沫內諸藥  
煮取二升去滓溫服八合日三不知更作之忌海藻

松菜羊肉飴

並出第十  
八卷中

深師療欬而上氣肺脹其脉浮心下有水氣小青龍湯

加石膏二兩設若有實者必躁其人常倚伏小青龍湯

方

用前仲  
景方

千金療肺脹欬上氣咽燥脉浮心下有水麻黃湯方

麻黃

去節

芍藥

生薑

五兩

細辛

桂心

各三兩

半夏

半升洗

石膏

四兩

五味子

半升

右八味切以水一斗煮取三升分三服忌生葱羊肉

錫生菜

集驗同出第  
十七卷中

肺氣積聚方二首

救急療肺氣積聚心肋下滿急發即效逆上氣方

麻黃

三兩  
去節

杏仁

去雙仁  
去皮

柴胡

生薑

半夏

洗十  
遍

葶藶子

熬研如脂  
各四兩

乾棗

十二  
枚擘

檳榔

十  
枚

右八味切以水一斗煮取二升八合去滓分溫三服

每服相去如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊

肉此方服一劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉鰾  
又方

茯苓

乾蘇莖菜

橘皮

麻黃

各三兩

杏仁

去尖皮  
兩仁者

柴胡

生薑

各四兩

右七味切以水一斗煮取二升七合去滓分溫三服

每服如人行八九里久禁酢物蒜熱麴猪肉五日服

一劑

並出第  
六卷中

肺癰方九首



千金論曰病欬唾其脉數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛脉反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死後終吐膿死其脉何類何以別之師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴唾而濁沫時時

振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可  
救膿已成則難治寸口脉數跌陽脉緊寒熱相搏故振  
寒而效跌陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰跌陽脉浮緩  
少陰微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳其病屬肺也  
問曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此  
為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知  
有膿膿之所在何以別知其處師曰假令在胃中者為  
肺癰其脉數效唾設膿未成其脉自緊數緊去但數膿

為已成也

出第十  
七卷中

仲景傷寒論欬胸中滿而振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者肺癰也桔梗白散主之方

桔梗

三分

貝母

三分

巴豆

一分去皮心  
熱研作脂

右三味搗篩強人飲服半錢匕羸人減之若病在膈上者必吐膈下者必利若利不止者飲冷水一杯則

定忌猪肉蘆笋等

出第十  
八卷中

集驗療胃中滿而振寒脉數咽燥而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是為肺癰桔梗湯方

桔梗

二兩千金古今方云用一兩

甘草

二兩炙

右二味切以水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血

則差

張文仲千金備急古今錄驗范汪同此本仲景傷寒論方出第四卷中

千金療效有微熱煩滿胃心甲錯是為肺癰黃昏湯方

黃昏

手字大一枚即合歡木皮

右一味切以水三升煮得一升分再服

范汪同

又肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之魚療胃脘脹  
滿一身面目浮腫鼻塞涕出不聞香臭酸辛欬逆上  
氣喘鳴迫塞方

葶藶

三熱令  
色紫

右一味搗令可丸以水三升煮擘大棗二十枚得汁

二升內藥如彈丸一枚煎取一升頓服

古今錄驗剛  
繁仲景傷寒

論范汪同並出  
第十七卷中

備急療腸癰肺癰方

升麻

白斂

漏蘆

芒硝

各一兩

黃芩

枳實

炙

連翹

蛇銜

各三兩

梔子

二十枚

蒴藿根

四兩

右十味搗令細以水三升漬經半日以猪脂五升煎

令水竭去滓傳之日三若交急合水煎

出第四卷中

古今錄驗療肺癰方

薏苡仁

一升

醇苦酒

三升

右二味煮取一升溫令頓服有膿血當吐

范江經心錄同

又療肺癰葦莖湯方

劉葦

一升

薏苡仁

半升

桃仁

五十枚去尖皮兩仁者

瓜瓣

半升

右四味㕮咀以水一斗先煮葦令得五升去滓悉內

諸藥煮取二升分再服當吐如膿

仲景傷寒論云葦葉切二升千金范

汪同千金云葦莖二升先以水二斗煮五升

又療肺癰經時不差桔梗湯方

桔梗

三升

白朮

二兩

當歸

一兩

地黃

二兩

甘草

炙

敗醬

薏苡仁

各二兩

桑白皮

一切

右八味切以水一斗五升煮大豆四升取七升汁去

豆內清酒三升合諸藥煮之取三升去滓服六合日

三夜再忌猪肉蕪荑桃李雀肉海藻松菜等

又療肺癰生地黃汁湯方

生地黃汁

一升

當歸

甘草

炙

白石英

綿裹

人參

各一兩

附子

二分炮

白小豆

三十顆

白雞一頭

男用雌女用雄療  
如食法一作雄



右八味切以水一斗五升煮雞取七升汁去滓內地  
黃汁諸藥等煮取三升去滓分服六合日三夜二忌  
蕪荑海藻松菜冷水猪肉等

並出第二  
十一卷中

### 大腸論二首

千金論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央以為候也肺所  
以合氣於大腸者大腸為行道傳瀉之腑也號監倉掾  
重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸臍右廻疊積還反  
十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脉和利精神

又曰肺前受病移於大腸肺效不已則大腸受之大腸  
效則遺失便利肺應皮皮厚即大腸厚皮薄即大腸薄  
皮緩腹脹大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑  
者大腸直皮肉不相離者大腸結

刪繁  
同

又扁鵲云大腸絕不療何以知之洩痢無度痢絕則死  
實即腸熱熱則脹滿不通口為生瘡食下入腸則腸實  
而胃虛下胃則胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛  
乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴洩青白之痢而發

於氣水根在大腸大腸有寒驚澹有熱便腸垢大腸有  
宿食寒慄發熱有時如瘧狀大腸病者腸中切痛而鳴  
濯濯冬日重感於寒則洩當臍而痛不能久立與胃同  
候腸中雷鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸也大腸  
脹鳴而痛腸寒即洩食不化

出第十  
八卷中

### 大腸熱實方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病  
苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實

熱也又療大腸實熱腹脹不通口為生瘡生薑洩腸湯方

生薑

橘皮

青竹茹

白朮

黃芩

梔子

各三兩

桂心

一兩

生地黃

十兩

茯苓

芒硝

各二兩

大棗

十四枚擘

右十一味切以水七升煮取三升去滓下芒硝分三

服忌生葱薤藹海藻松菜醋物桃李雀肉等

出第十卷中

刪繁療肺脉厥逆大於寸口主大腸熱欬上氣喘鳴心

煩麻黃湯方

麻黃

六兩  
去節

芍藥

生薑

半夏

洗十

細辛

五味子

各三兩

桂心

二兩

石膏

八兩

右八味切以水九升先煮麻黃七八沸去沫次下諸

藥煎取三升去滓分三服忌羊肉錫生葱生菜等

又療大腸熱甚脅滿掌中熱淡竹葉飲泄熱氣方

淡竹葉

切三升

橘皮

三兩

乾蘇葉

三兩

白朮

四兩

甘草

一兩炙

葱白

切一升

桂心

一兩

石膏

六兩碎

杏仁

六十枚去  
皮尖熬

右九味切以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓澄  
清取九升下諸藥煮取三升絞去滓分三服若須利  
下內芒硝三兩忌海藻松菜桃李雀肉生葱

並出第  
二卷中

大腸虛寒方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病  
苦胃中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛  
寒也

又療大腸虛寒痢下青白腸中雷鳴相逐黃連補湯方

黃連

四兩

茯苓

四兩

醋石榴皮

四枝

芎藭

三兩

地榆

五兩

伏龍肝

如雞子大一枚

右六味切以水七升煮五味取二升五合去滓下伏

龍肝屑攪調分三服忌豬肉冷水火醋

出第十卷中

刪繁療大腸虛寒欠呿欬氣短少腹中痛欬冬花丸方

欬冬花

七分

桂心

五味子

各六分

乾薑

芎藭

甘草

炙各五分

附子

四分炮

桔梗

四分

蘇子

熱 五合

蜀椒

升 一

百部汁

合 七

白蜜

升 一

乾棗

五十枚 去皮

薑汁

升 一

右十四味細搗為末將薑蜜汁和微火上煎取為丸如梧子每服溫酒下三十九加至四十九日再忌海藻菰菜猪肉冷水生葱

出第二卷中

皮虛實方二首

刪繁論曰夫五藏六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓



疼痛然陰陽表裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮

虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主于肺大腸其病發

於皮毛熱即應藏寒即應腑

千金同出  
第三卷中

千金療皮虛主大腸病寒氣關格蒟藳蒸湯方

蒟藳根葉

切三  
升

桃皮葉

剉三  
升

菖蒲葉

剉三  
升

細糠

一  
斗

秣米

五  
升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯於

上作小竹牀子罩盆人身坐牀中四面周迴將席薦

障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對口洩氣取  
通身接汗可作兩食久許如此三日若盆裏不過熱  
盆下安炭火也非惟療寒但是皮膚下一切勞冷並  
皆療之忌羊肉錫刪繁同

又療皮實主肺病熱氣梔子煎方

梔子

枳實

炙

大青

杏仁

去兩仁  
炙皮

柴胡

芒硝

各三  
兩

生地黃

切一  
升

石膏

八  
兩

淡竹葉

切一  
升

生玄參

五  
兩

右十味切以水九升煮取三升下芒硝分三服忌蕪

蕪

剛繁同並出  
第十八卷中

上氣方九首

廣濟療上氣方

葶蘆子

五合熬紫色  
別搗如泥

桑根白皮

切

大棗

二十枚

右三味以水四升煮取一升絞去滓內葶蘆子泥如

棗大煮之三分減一頓服以快利為度忌如藥法

出第

二卷

中

肘後主上氣方

灸從大椎數下行第五節下第六節上空間即灸

一處隨年壯秘方

深師千金翼文仲  
同出第三卷中

千金療上氣方

上酥

升一

獨頭蒜

五顆去皮先以酥  
煎蒜蒜黃出之

生薑汁

二合

右三味同煎使熟空腹服一寸匕溫服之忌熱麪

又方

芥子

三升

右一味末之蜜和為丸寅時井華水服如梧子七丸

日二服散亦佳禁如藥法尤忌油麵等

並出第十卷中

必効療上氣方

半夏

洗

茯苓

各四兩

橘皮

白朮

各三兩

生薑

五兩

檳榔

十顆

右六味切以水一斗漬一宿煮取二升七合分三服

更加甘草

三人

參

二兩

前胡

二兩

紫蘇

一兩

忌羊肉

錫桃

李

雀肉醋物

出第一卷中

古今錄驗溫中湯療上氣方

甘草

炙 三兩

桂心

兩 四

生薑

斤 一

右三味切以水七升半煎取三升分五服忌生葱海

藻松菜

又昆布丸療胃滿上氣方

大黃

硝石

海藻

洗

水銀

各一兩

昆布

洗 三兩

苦瓠瓣

枚 四十

葶藶

熱 半升

通草

分 二

桃仁

枚 五十  
熱

右九味擣篩以蜜和為丸如梧子許先食服三丸日再服

又已試鯉魚湯療上氣方

杏仁

熬

貝母

桂心

各三兩

橘皮

人參

甘草

炙

厚朴

炙

麻黃

去節

茯苓

胡麻

白前

各二兩

鯉魚

五斤

生薑

六兩

半夏

五兩洗

右十四味切先以水二斗煮魚得一斗二升去魚內

藥煎取三升二合分四服日三夜一忌海藻松菜醋  
物羊肉錫生葱等物

又上氣二物散

本司馬大  
將軍方

麻黃

一斤  
去節

杏仁

一百  
枚

右藥各別搗合和下篩為散上氣發時服方寸匕可  
至三方寸匕以氣下為候不必常服

深師療上氣魚  
數范汪同並出

第十九

卷中

卒上氣方六首



深師療卒上氣胃心滿塞半夏蘇子湯方

半夏

五兩洗

蘇子

一升

生薑

五兩

大棗

四十枚擘

橘皮

桂心

各三兩

甘草

二兩

右七味切水七升煮取二升七合分三服氣即下忌

海藻崧菜羊肉飭生葱

又療卒急上氣胃心滿竹篠下氣湯方

生甘竹篠

一虎口

石膏

一兩

生薑

橘皮

各三兩

甘草

三兩炙

右五味切以水七升煮竹籛取四升半去滓內諸藥煮取二升分二服此方療忽上氣不止者服兩三劑

差忌海藻松菜

並出第十卷中

備急葛氏療卒上氣鳴息便欲絕方

桑根白皮

切三升

生薑

切半升

吳茱萸

半升

右三味切以酒五升煮三沸去滓盡令服之入口則

愈

千金秘方

又方

麻黃

去節

甘草

炙各二兩

右二味切以水三升煮取一升半分三服古今錄驗  
用水八升煮取三升八合忌海藻松菜差後欲令不  
發者更取二味并熬杏仁五十枚擣篩蜜和丸服四  
五九日三

文仲肘後  
范汪同

又療卒上氣氣不復報肩息方

乾薑

三兩  
咬咀

右一味以酒一斗漬服一升日三服

又方

麻黃

三兩  
去節

桂心

甘草

炙各  
一兩

杏仁

如法  
製

右四味切以水六升煮取二升分三服此二方名小  
投杯湯有氣疾者亦可為散將服之冷多加乾薑三  
兩淡唾者加半夏三兩忌海藻松菜生葱

出第三  
卷中

久上氣方四首

千金療積年上氣不差垂死者方

葶藶子

熟今  
已變

熟羊肺

薄切暴  
乾為末

右二味各別搗等分以七月七日神酢拌令相著夜  
不食空肚服二方寸匕須臾拾針兩食間以冷漿白  
粥二口止之隔日一服永差三十日內得煮飯汁作  
蕪菁羹食之以外一切禁斷

文仲肘  
後同

又療上氣三十年不差方

大棗

一百枚  
去核皮 豉 一百二十顆

杏仁

一百粒

椒

二百粒汗

右四味先搗杏仁令極熱後內棗椒豉更搗作丸如

棗核大含稍稍嚥之日三夜

並出第十  
七卷中

近効療久上氣氣急卧不得方

紫蘇葉

二兩

生薑

麻黃

去節

杏仁

各三兩

赤茯苓

桑根白皮

葶藶子

各二兩熱

橘皮

一兩半

右八味切以水八升先煮麻黃去沫下諸藥和煮取  
二升七合絞去滓分三服每服如人行七八里久溫  
服之畢服後丸

又丸方

葶藶子

六兩熱  
今紫色

右一味搗如泥丸如梧子大每食後以棗飲下十九  
日二服乾棗十顆擘碎以水一升煮取五合去滓用  
下丸甚効

上氣胃滿方二首

古今錄驗胡椒丸療欬上氣胃滿時復嘔沫方

胡椒

華撥

乾薑

各三兩

白朮

二兩

桂心

高良薑

人參

款冬花

紫苑

甘草

炙各二兩

右十味搗篩蜜和丸如梧子一服五丸日二服不知增之以知為度忌生冷醋滑猪魚肉蒜桃李雀肉生

葱海藻菰菜

出第十  
九卷中

救急茯苓人參散療上氣胃脅滿悶益心力除謬忘永  
不霍亂能飲食此方功力諸藥不逮有人年四十時因  
患積痢羸憊不能起止形狀如七十老人服此藥兩劑  
平復如舊久服延年益壽方

茯苓

二斤去黑皮擘破如棗大清水清經一  
日一夜再易水出於日中曝乾為末



人參

七兩  
持

甘草

一兩  
炙切

白沙蜜

一升  
五合

牛乳

七升

右五味以水五升內甘草煮取二升除甘草澄濾內茯苓緩火煎令汁欲盡次內白蜜牛乳次內人參緩火煎令汁盡仍攪藥令調勿許焦成日中曝乾擣篩為散以紙盛之溫乳及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水和當麩忌海藻松菜大醋並是大斗大升大秤兩也此方極驗合數劑立効

出第六  
卷中

上氣效身面腫滿方四首

崔氏療肺熱而欬上氣喘急不得坐卧身面腫不下食  
消腫下氣止欬立驗方

葶藶子

二十分熬

貝母

六分

杏仁

十二分炮

紫菀

六分

茯苓

五味子

各六分

人參

八兩

桑白皮

八兩

右八味搗篩蜜和丸如梧子一服十九日二服甚者  
夜一服漸漸加至二三十丸煮棗汁送之若腥氣盛  
者宜服此藥若小便不利者宜服後方忌酢物

又方

葶蘆子

二十分熱

杏仁

十二分

牽牛子

八分熱

茯苓

六分

右四味搗篩蜜和為丸如梧子許每服八丸日再夜

一漸漸加至二十丸煮棗汁送之大忌醋物

又療上氣欬嗽長引氣不得卧或水腫或遍體氣腫或

單面腫或足腫並主之方

葶蘆子

三升微熱

右一味搗篩為散以清酒五升漬之春夏三日秋冬

七月初服如胡桃許大日三夜一冬日二夜二量其

氣力取微利為度如患急困者不得待日滿亦可以  
綿細絞即服其莖莖單莖向上葉端兩角角麤且短  
又有一種苟芥草葉近根下作歧生角細長採時必  
須分別前件六種病狀發動各不同始終至困並歸  
於水但人腹內有塊及兩邊皆有者或當心有塊稍  
壯大者並是水病即此藥必須得好新熟無灰酒清  
者始可用經日多者惡不堪用前件病皆是熱服藥  
唯須慎酒麪生冷雞豬魚肉大困及不得卧入口則

定老少任意量力必須好差平復始可停藥此方神

驗服藥如傷多悶亂者作土漿飲即定

並出第  
六卷中

必効療上氣欬嗽腹滿體腫方

取楸葉

三升

右一味煮三十沸去滓煎堪作丸如小棗子以竹筒

內下部立愈

出第一  
卷中

上氣喉中水雞鳴方一十二首

深師療久逆上氣胃滿喉中如水雞鳴投杯湯方

小麥

一升

麻黃

四兩  
去節

厚朴

五兩

石膏

如雞子

杏仁

五合

右五味以水一斗煮取小麥熟去麥內藥煮取三升分三服欬嗽甚者加五味子半夏洗各半升乾薑三累經用甚良

又療上氣脉浮欬逆咽喉中水雞鳴喘息不通呼吸欲死麻黃湯方

麻黃

八兩  
去節

射干

二兩

甘草

四兩  
炙

大棗

三十顆

右四味切以水一斗先煮麻黃三沸去上沫內諸藥  
煮取三升分三服已用甚良忌海藻菰菜等

又療欬逆上氣胃中塞不得息卧不安席牽繩而起咽  
中如水雞聲投杯湯方

款冬花

二十分

杏仁

四十顆

甘草

一兩

大棗

二十顆

桂心

二兩

麻黃

四兩  
去節

生薑

半夏

洗各  
三兩

紫菀

細辛

各一兩

右十味切以水八升煮取二升頓服之一方分再服

卧令汗出食粥數口勿飽食神良忌海藻松菜羊肉  
錫生葱生菜

又療欬逆上氣燥嗽冷嗽晝夜甚喉中水雞鳴鍾乳丸  
方

鍾乳

人參

桂心

乾薑

各八分

附子

炮

款冬花

細辛

各六分

紫菀

十分

杏仁

四分

右丸味擣篩蜜和酒服如小豆二丸日三不知稍稍



加之忌猪肉冷水生葱生菜等物

又療上氣欬嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭麻黃湯方

麻黃

六兩  
去節

桂心

一兩

甘草

炙

杏仁

去皮  
各二兩

生薑

八兩一方用  
乾薑三兩

右五味切以水七升煮取三升半分五服已用療欬  
唾膿血喉中腥臭得力後長將丸服忌海藻菰菜生  
葱

又療久欬上氣喉中鳴晝夜不得卧貝母散方

貝母

三兩

麻黃

去節

乾薑

各二兩

桂心

甘草

炙各一兩

右五味搗篩平旦酒服方寸匕日二不知增之至二匕大劇可至再服酒隨飲多少忌海藻松菜生葱等又療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧喉常作水雞鳴白前湯方

白前

二兩

紫苑

半夏

洗各三兩

大戟

切七合

右四味切先以水一斗漬之一宿明旦煮取三升分

三服忌羊肉錫

此方四味千金方見水腫欬上氣中  
十金古今錄驗同並出第十八卷中

小品療欬逆喉中如水雞聲貝母湯方

貝母

甘草

炙各二兩

麻黃

去節

桂心

各四兩

半夏

洗

乾薑

各三兩

杏仁

七十枚

右七味切以水二斗三升先煮麻黃得十沸內藥煮

取三升溫服七合日三忌海藻松菜生葱羊肉錫

古今

鮮驗同

又療欬而上氣咽中如水雞聲射干麻黃湯方

射干

十二枚

麻黃

去節

生薑

各四兩

紫菀

三兩

款冬花

三兩

細辛

三兩

五味子

半升

半夏

八枚洗

大棗

七枚

右九味切以東流水一斗二升煮取三升分三服忌

羊肉錫生菜

此本仲景傷寒論方千金古今雜驗同並出第一卷中

必効療病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近

方

肥皂英

兩批

好酥

一兩

右二味於火上炙去火高一尺許以酥細細塗之數  
翻覆令得所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去  
子皮筋脉擣篩蜜和為丸每日食後服一丸如熟豆  
日一服訖取一行微利如不利時細細量加以微利  
為度日止一服忌如藥法

出第一  
卷中

古今錄驗沃雪湯療上氣不得息卧喉中如水雞聲氣

欲絕方

麻黃

四兩  
去節

細辛

二兩

五味子

半升

桂心

乾薑

各一兩

半夏

八枚洗去滑  
一方四兩

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓適寒溫服一升投杯則卧一名投杯麻黃湯令人汗出不得卧勿怪亦可從五合不知稍增日再凡煮麻黃先煎二沸去上沫又內餘藥忌生葱生菜羊肉錫

集驗經心  
鮮范汪同

又投杯湯療久欬嗽上氣胃中寒冷不得息食卧不安席每牽繩而起咽中如水雞聲方

款冬花

四十兩

細辛

一兩

紫菀

三兩

甘草

炙

桂心

麻黃

去節

乾薑

各二兩

五味子

半升

杏仁

四十枚

半夏

半升洗

右十味切以水八升煮取二升分再服卧汗出即愈

忌海藻松菜生葱生菜羊肉餒

並出第九卷中

因食飲水上氣方四首

古今錄驗宮泰說李將軍兒得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不差遂亡本由食餅後乃飲水得之服五味湯不差此輩皆死是後乃有婢得之行極而渴飲水多

此為所發起同與五味湯亦不差然後小差秦因此與  
三物備急藥半錢吐下得差由此思惟病之所由以冷  
水入肺及入腸寒熱不消化結聚逼迫於胃口故令其  
呼吸乏氣息不得下過謂喘而上氣息數也宜吐下之  
亦可與三物瓜蒂散吐之

三味備急散本療卒死感忤宮秦以療人卒上氣呼吸  
氣不得下喘逆差後已為常用方

巴豆

乾薑

大黃



右藥等分巴豆小熬去心皮合擣下篩服半錢匕得

吐下則愈忌野猪肉蘆笋

范汪同

又三味吐散宮泰以療上氣呼吸喘逆方

瓜蒂

三分

杜蘅

三分

人參

一分

右藥擣篩為散以溫湯服一錢匕老小半之

范汪同並出第

十九

卷中

肘後療大走馬奔走喘乏便飲冷水冷飲因得上氣發

熱方

竹葉

三斤

橘皮

三兩切

右二味以水一斗半煮取三升去滓分為三服三日

服一劑良集驗用竹葉三兩

文仲備急  
范汪等同

又方

葶藶子

一兩  
熱搗

乾棗

四十  
顆

右二味以水三升先煮棗取一升內葶藶子煎取五

合大人分一二服小兒分三四服

並出第  
一卷中

卒短氣方四首

肘後卒短氣方

搏韭取汁服一升立愈

文仲備急千金  
同出第一卷中

千金療卒短氣方

枸杞葉

二兩

生薑

二兩切

右二味以水三升煮取一升頓服之

又方

生薑

五兩切

小麥

一升

右二味以水七升煮取一升頓服之

又方

紫蘇莖葉

切一升

大棗

二七枚

右二味以酒三升煮取一升半分再服水亦得又方

加橘皮半兩

並出第七卷中

上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首

廣濟療肺氣痰上氣急及欬方

柴胡

五兩

五味子

橘皮

紫莞

貝母

杏仁

各三兩

麻黃

四兩去節

甘草

炙

黃芩

各二兩

右九味細切擣令極碎每服取麥門冬一兩去心生薑半兩切竹葉一兩半以水二升五合先煮麥門冬生薑竹葉有一升五合內散二兩煎取一升二合絞去滓分二服平旦空肚服之一服日晚食消後服之每日作一劑忌油麪猪犬肉小豆粘滑酸鹹海藻松

菜

出第三卷中

肘後療欬上氣喘息便欲絕方

末人參服之方寸匕日五六

出第一卷中

深師療上氣及諸逆氣神驗白前湯方

白前

五兩

紫菀

杏仁

厚朴

炙各三兩

半夏

洗

麻黃

去節各四兩

生薑

一斤一方用八兩

人參

桂心

各二兩

甘草

一兩炙

大棗

十四枚

右十一味切以水八升煮取二升半分三服良忌海

藻松菜羊肉生葱錫

又療肺氣不足欬嗽上氣牽繩而坐吐沫唾血不能食

飲補肺溢湯方

蘇子

升一

桑白皮

兩五

半夏

洗六兩

紫菀

人參

甘草

炙

麻黃

節六

五味子

乾薑

杏仁

去皮尖各一兩

細辛

半兩

桂心

三兩

款冬花

兩一

射干

兩一

右十四味切以水一斗二升煮取三升分五服日三

夜再忌海藻松菜羊肉錫生葱生菜

同千金

又療諸欬病上氣胃滿晝夜不得卧困篤鍾乳丸方

鍾乳

八分

乾薑

六分

款冬花

細辛

桑白皮

半夏

洗各四分

貝母

附子

炮各五分

蜀椒

三分

芎藭

四分

紫菀

八分

杏仁

三分

右十二味擣篩蜜和服如大豆二九日三忌冷食猪

羊肉飭生菜

並出第十八卷中

千金療上氣不得卧神秘方

橘皮

生薑

紫蘇

人參

五味子

各三兩



右五味切以水七升煮取三升分三服

一方有桔梗無五味子出

第十七卷中

古今錄驗療積病後暴上氣困篤投杯湯方

石膏

四兩碎

甘草

二兩炙

五味子

三兩

大棗

二十枚

人參

桂心

半夏

洗

杏仁

各二兩

麻黃

三兩去節

生薑

四兩

右十味切以水一斗煮取三升一服六合日三夜一

忌羊肉錫海藻松菜生葱等

又療上氣呼吸牽繩肩息欲死覆杯湯方

麻黃

四兩  
去節

甘草

炙

乾薑

桂心

貝母

各二兩

右五味切以水八升煮取二升分再服則愈有人先有風患兼有石熱取冷當風飲酒房室體虛未春因天行病至夏中差尚虛有風熱未除兼藥石勢過傷於胃氣因腹脹堅如石氣息不利因自下後變四肢腫遊走無定小便不通積服利藥忽吐逆不下食變

噦至掣動百脉狀如噓唏積日乃變上氣服此方加

杏仁二兩與兩劑上氣得止忌海藻生菜菰菜

范汪經心

錄同出第十九卷中

### 欬嗽上氣方七首

病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒微則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘欬上氣此為邪搏於氣氣擁滯不得宣發是為有餘故欬嗽而上氣也其狀喘欬上氣多

涕唾面目浮腫則氣逆也

出第十卷中

深師療上氣欬嗽蘇子煎方

蘇子

升二

生薑

升二

白蜜

升二

杏仁

升二

生地黃

升二

右五味搗蘇子以地黃薑汁澆之絹絞取汁更搗以  
汁澆復絞如此六七過令味盡去滓熬杏仁令黃黑  
搗令如脂又以向汁澆之絹絞取汁往來六七過令  
味盡去滓內蜜和置銅器中於重湯中煎之令如飴  
煎成一服方寸匕日三夜一忌蕪荑

千金  
同

又療欬嗽上氣射干煎方

射干

兩八

紫苑

兩半

膠飴

兩五

細辛

兩半

乾薑

五兩  
末

生竹瀝

一升

芫花根

兩半

桑根白皮

款冬花

各八兩

附子

兩半

甘草

兩半

白蜜

一升半

右十二味先切射干合蜜竹瀝汁煎五六沸絞去滓

呖咀諸藥以水一升四合漬一宿煎之七上七下去

滓乃合飴薑末煎令如餠服酸棗丸許日三夜一

不知稍增之忌海藻松菜猪肉冷水生菜

同十金

又療欬上氣中寒冷鼻中不利杏仁煎方

杏仁

五兩

五味子

三合

甘草

四兩

麻黃

一斤去節

款冬花

三合

紫菀

乾薑

各三兩

桂心

四兩

右八味切以水一斗煮麻黃減二升掠去沫乃內諸

藥煮取四升絞去滓又內膠飴半斤白蜜一斤合內

汁中攪令相得湯中煎如飴成先食服如半棗日三

不知稍加之忌海藻松菜生葱

千金同出第  
十八卷中

崔氏療上氣暴欬方

紫蘇

莖葉  
二升

大豆

一升

右二味以水四升煮大豆次下紫蘇煮取一升五合

分為三服晝二夜一忌醋鮓鹹酸油膩等

出第六  
卷中

必効主上氣腹脹心胃滿并効不能食方

段明府  
云極効

枇杷葉

一握去  
毛炙

檳榔

三七  
顆

生薑

二分

高良薑

二兩

蜜

二合

酥

二合

右六味切以水二大升煮取一大升湯成後內酥蜜

更煮三五沸分溫三服每服如人行八九里久甚重

者三兩劑任意食之

出第一  
卷中

救急療上氣欬肺氣胃痛方

杏仁

升 三大

白蜜

升 一大

牛酥

升 二大

右三味杏仁擣碎於瓷盆中研取汁五升淨磨銅鐺  
勿令脂膩先傾三升汁於鐺中刻木記其深淺又傾  
二升汁以緩火煎減至於所記處即內白蜜及酥還  
至木記處藥乃成貯不津瓷器中每日三度以煖酒  
服一大匙不能飲酒和粥服亦得服一七日唾色變



白二七日唾稀三七日效斷此方非但療效兼補虛損去風冷兼悅肌膚白如瓠婦人服之更佳

延年秘錄同出

第六卷中

古今錄驗療上氣兼效蘇子湯方

蘇子

一升

五味子

五合

麻黃

去節

細辛

紫菀

黃芩

甘草

炙各二兩

人參

桂心

當歸

各一兩

半夏

洗三兩

生薑

五兩

右十二味切以水九升煮取三升分二服上氣病亦

特單煮蘇子及生蘇葉冬天煮乾枝莖葉亦佳忌海

藻菰菜羊肉錫生葱生菜

出第十  
九卷中

欬逆上氣嘔吐方四首

病源五藏皆稟氣於肺肺感微寒則成欬嗽也寒搏於  
氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五  
藏傷動動於胃氣者則胃氣逆而嘔吐也此是肺欬連  
滯氣動於胃而嘔吐者也又有季夏脾王之時而脾氣  
虛不能王有寒氣傷之而欬嗽者謂之脾欬其狀欬則

右脅下痛陰陰引膊背甚則不可動動則欬發脾與胃合脾欬不已則胃受之其狀欬嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸欬嗽甚則嘔吐各隨證候知其腑藏也

出第十四

中卷

深師療欬嗽上氣喉咽中腥臭虛氣攪心頭痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注天行食不生肌胃中隔塞嘔逆多唾惡心心下堅滿飲多食少療症并淋通氣丸方

膠飴

五斤

蜀椒

二升

烏頭

七分

桂心

六分

大附子

五枚  
炮

乾薑

人參

各四  
分

杏仁

一  
升

天門冬

十  
分

蜈蚣

五節去  
頭尾

右十味末之擣杏仁作膏稍稍內藥末擣千過烱膠  
飴乃內藥中攪令調和合如半棗一枚日六七夜二  
三服令胃中溫為度若夢與鬼神交通及飲食者全  
用蜈蚣食不消者加杏仁五合有虛氣少腹急腰痛  
加天門冬杜仲有風加烏頭二枚附子一枚立夏後  
勿加也有留飲加葶藶子一兩熬末之忌豬肉冷水

生葱鯉魚等物

千金同

又療上氣欬逆口乾手足寒心煩滿積聚下利嘔逆若  
墜瘀血上氣胃脅脹滿少氣腸鳴飽食傷中裏急婦人  
乳飲滯下有邪濕陰不足大小便不利肢節皆痛硝石  
丸方

硝石

一升

乾薑

前胡

大黃

各一斤

杏仁

一升

右五味搗篩蜜和飲服如梧子三丸日再五日後

心腹諸疾隨大小便去月經絕則通下長蟲數十  
亦利血及冷熱赤白汁癥瘕毒悉主之藥利以意  
消息

又療上氣煩悶嘔逆不得飲食厚朴湯方

厚朴

炙 一兩

人參

一兩

半夏

洗 四兩

生薑

八兩

茯苓

甘草

炙

橘皮

桂心

各二兩

枳實

二兩 炙

右九味切以水八升煮取三升分三服忌海藻松菜

羊肉錫生葱醋物

並出第十  
八卷中

必効療上氣欬嗽嘔逆不下食氣上方

橘皮

紫莞

各三兩

人參

茯苓

柴胡

杏仁

去尖  
皮

右六味切以水六升煮取二升分為三服患冷加生

薑二兩患熱加麥門冬三兩去心不能食加白朮二

兩厚朴二兩炙忌醋物桃李雀肉等

出第一  
卷中

上氣欬嗽多唾方三首

廣濟療上氣肺熱欬多涕唾方

白前

分四

生麥門冬

十分  
去心

貝母

石膏

甘草

炙

五味子

生薑

各四分

黃芩

分五

杏仁

四十  
顆

淡竹葉

切一  
升

白蜜

一  
匙

右十一味切以水七升煮取二升七合絞去滓內白

蜜更上火煎三沸分溫三服每服如人行五六里須

利三兩行湯成後宜加芒硝八分忌熱麪炙肉油膩

醋食海藻松菜

出第二  
卷中



古今錄驗小紫菀丸療上氣夜欬逆多唾濁方

乾薑

甘皮

一作甘草

細辛

款冬花

各三

分

紫菀

三分

附子

二枚炮

右六味擣篩以蜜和為丸如梧子先食服三丸日再  
以知為度忌冷水猪肉生菜等物

又療欬氣上多涕唾杏仁煎方

出徐王

杏仁

一升

右一味擣碎研取大升三升汁以水和研之煎取一

大升酒服一匙日三忌猪雞魚肉胡荽等物

並出第十卷

中

上氣效方一首

古今錄驗療效逆上氣胃滿多唾

太醫令王叔和所撰已更御服甚良効方

乾薑

三分

礬石

一分泥裏燒半日

蜀椒

五分

細辛

二分

烏頭

一分炮去皮

杏仁

一分

吳茱萸

四分

洗

菖蒲

一分

紫菀

一分

皂莢

一分去皮

炙子

款冬花

三分

麻黃

四分去節

右十二味搗篩蜜和丸如梧子夜卧吞一九日二不  
知加之療二十年效不過二十丸便愈御藥也秘在  
石室不傳忌猪羊肉錫生菜冷水

一方有桂心三分  
無麻黃千金同出

第十九卷中

久欬嗽上氣方三首

肘後療久欬上氣十年二十年諸藥療不差者方

猪胰

三具

乾棗

一百顆

右二味以酒三升漬數日服二三合至四五服愈服

盡此則差

千金同出  
第三卷中

深師療久上氣欬麻黃散方

司馬太傳欬  
常將此服愈

麻黃

一斤  
去節

杏仁

一百  
枚

甘草

二兩  
炙

桂心

一兩

右四味搗篩別搗杏仁如脂內諸末合令調臨氣上發時服方寸匕氣下止食頃氣不下更服一匕可至

三匕氣發便服即止忌海藻菰菜生葱

千金古今  
錄驗同

又療久上氣欬亦療傷寒後欬方

甘草

二兩  
炙

大棗

二十  
枚

右二味以水七升煮取二升分再服數用驗忌海藻

松菜等

古今錄驗名溫脾  
湯並出第八卷中

欬逆上氣方五首

病源肺虛感微寒而成欬欬而氣還聚於肺肺則脹是  
為欬逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆上喉  
咽之間邪伏則氣靜邪動則氣奔上煩悶欲絕故謂之

欬逆上氣

出第十  
四卷中

深師療欬逆上氣支滿息欲絕氣結於胃中心煩躁不

安一合湯方

芫花

二分  
熬

桂心

乾薑

各五分

甘草

炙

細辛

各四分

芫花

二分

右六味切以水三升煮取一升先食服一合日三夜  
一又云合湯亦得分六七服一日盡便愈一方有芎  
藭四分無芫花忌海藻松菜生葱生菜等

又療欬逆上氣腹中有堅痞往來寒熱令人羸瘦不能  
飲食或時下痢此腹中如絞在臍上下關疝氣上腸使

然為病有氣涌逆蜀椒散方

蜀椒

五合去目并  
閉口者汗

桂心

甘草

各一  
兩

通草

半夏

洗各  
三兩

右五味搗篩飲服方寸匕日三夜一忌海藻松菜羊

肉飭生葱

並出第十  
八卷中

古今錄驗麥門冬丸主氣逆上氣方

乾薑

六分

麥門冬

十分  
去心

昆布

洗

海藻

洗各  
六分

細辛

海蛤

蜀椒

熬

桂心

各四  
分

右八味擣篩蜜和丸如梧子以飲服十丸漸加至二十丸日三有人患風虛得冷輒胃中上氣喉中常如吹管聲效嗽唾清沫將此丸服得差若散服方寸匕日

三忌生葱生菜

經心  
鉾同

又鯉魚湯療效逆上氣喉中不利方

生鯉魚

尾一

熟艾

升二

白蜜

升一

紫苑

牡蠣

各四  
兩熬

款冬花

升一

杏仁

二十  
枚

豉

半  
升

射干

二  
兩

細辛

三  
兩

飴

八  
兩

菖蒲

二  
兩



右十二味㕮咀藥和內魚腹中置銅器中蒸之五斗  
米飯下藥成服一升日三夜一忌生菜羊肉錫等  
又杏仁煎療欬逆上氣方

杏仁

一升

石斛

乾薑

各四兩

桂心

甘草

炙

麻黃

去節各五兩

五味子

款冬花

紫菀

各三兩

右九味擣八味下篩以水一斗先煮麻黃取八升去  
滓內藥末膠飴半斤蜜一升攪令相得未食服如棗

大一枚日三忌生葱海藻松菜等

並出第二十九卷中

雜療上氣欬嗽方四首

廣濟療上氣欬嗽兼水氣癖氣方

葶藶子

蒸

貝母

桔梗

鼈甲

炙

防葵

各六分

白朮

茯苓

大戟

枳實

炙

紫莞

旋復花

杏仁

橘皮

各四分

芫花

二分

大黃

十分

皂莢

一分  
炙去

皮  
子

右十六味搗篩蜜和為丸空腹以飲服如梧子五丸  
日二服漸漸加至十丸以微利為度忌桃李雀肉葷  
菜醋物猪肉陳臭等

出第二  
卷中

深師療上氣搶心胃奄奄不得息腹中脹滿食輒吐蘇  
子湯方

蘇子

一升

大棗

三十顆

半夏

三兩洗

橘皮

生薑

桂心

各一兩

蜀椒

二分汗

右七味切以水七升煮取二升分三服忌羊肉鴿生

葱

出第十  
八卷中

古今錄驗半夏湯療上氣五藏閉塞不得飲食胃中脅  
下支脹乍去乍來虛氣結於心中伏氣住胃管脣乾口  
燥肢體動搖手足疼冷夢寐若見人怖懼此五藏虛乏  
諸勞氣不足所致并療婦人方

當歸

防風

黃芪

各二  
兩

柴胡

半  
斤

細辛

麻黃

去  
節

人參

各一  
兩

杏仁

五十  
粒

桂心

三  
兩

半夏

一升  
洗

大棗

二十  
枚

生薑

五  
兩

黃芩

一兩

右十三味切以水一斗先煮麻黃一沸去上沫更入水一升及諸藥煮取五升分為五服日三夜二忌羊

肉生葱生菜飴等

出第十  
九卷中

近効療上氣腹內脹滿飲食不消欲作霍亂及欬嗽紫蘇子丸方

紫蘇子

橘皮

各二兩


高良薑

桂心

人參

各一兩

右五味搗篩蜜和為丸每服十五丸酒飲任下若食  
瓜膾等物有生熟氣擬似霍亂者即半棗栗許大細  
細噉取汁令消盡應時立愈常有此藥永不患霍亂  
甚神効也忌生葱猪肉陳臭等物



外臺祕要方卷十